

LSVT LOUD®

DAS LSVT LOUD IST DIE **ERSTE DYSARTHRIETHERAPIE** MIT EVIDENZGRAD I UND NACHGEWIESENER EFFEKTIVITÄT ZUR BEHANDLUNG DER SPRECH- UND STIMMSTÖRUNGEN BEI MENSCHEN MIT PARKINSON-ERKRANKUNG UND IST ZUR ÜBERTRAGUNG AUF ANDERE NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN GEEIGNET.

- Das **LSVT LOUD** verbessert sowohl die Stimme als auch das Sprechen bei Menschen mit Parkinson-Erkrankung, indem die physikalische Pathologie, welche der Stimmstörung zugrunde liegt, behandelt wird.
- Die Behandlung ist darauf fokussiert, die Stimmlautstärke und die direkte Übertragung in die Alltagskommunikation zu verbessern. Sie ermöglicht es dem Patienten, seine mündliche Kommunikation **zu erhalten und/oder zu verbessern**.
- Das **LSVT LOUD** wird im Rahmen eines **intensiven Zeitplans** durchgeführt: 16 Einzelbehandlungen à 60 Minuten innerhalb eines Monats.
- In einem Vorher-Nachher-Vergleich verbessern 90% der Patienten ihre Stimmlautstärke.
- Bei ungefähr 80% der Patienten hält der Behandlungserfolg bezüglich der Stimme **12 bis 24 Monate** nach der Behandlung an.
- **Alle** Patienten berichten eine Verbesserung ihrer Kommunikationsfähigkeiten.
- Das **LSVT LOUD** wird von über 14.000 zertifizierten LSVT-Therapeuten in 62 Ländern durchgeführt.

Die wissenschaftlichen Untersuchungen wurden finanziell von den folgenden Organisationen unterstützt: National Institutes of Health-National Institutes on Deafness and Other Communication Disorders (NIH-NIDCD) Grants #P60 DC00976 und #R01 DC001150; Office of Education-National Institute for Disability and Rehabilitative Research (OE-NIDRR) Grants #H133G00079 und #H133G40108.

*****Weitere Informationen erhalten Sie bei*****

LSVT Global

Tel.: 1-520-867-8838 kostenlose Info-Hotline

EMAIL: info@LSVTGlobal.com Webseite: www.LSVTGlobal.com

Ramig, L., Sapir, S., Countryman, S., Pawlas, A., O'Brian, C., Hoehn, M., & Thompson, L. (2001). Intensive voice treatment (LSVT®) for individuals with Parkinson disease: A two-year follow-up. *J. Neurology, Surgery, and Psychiatry*, 71, 493-498.

Ramig, L., Sapir, S., Fox, C., & Countryman, S. (2001). Changes in vocal intensity following intensive voice treatment (LSVT®) in individuals with Parkinson disease: A comparison with untreated patients and normal age-matched controls. *Movement Disorders*, 16, 79-83